



**Semmelweis Egyetem,
II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika**

Reumatológiai beteg

**dr. Ponyi Andrea, Ph.D.
dr. Horváth Zsuzsanna, Ph.D.**

Gyermekgyógyászati konzultáció, V. évfolyam
2019



Anamnesis

5 éves kislány, 6 hete tartó panaszok: térdfájdalom, reggel nehezebben mozog, nem tud törökülésben ülni. Más panasza nincs.

Szisztémás érintettségre utaló?

láz, étvágytalanság, fogyás, izzadás, rossz általános állapot, sápadtság, lymphadenopathia, organomegalia (HSM)

Figyelmeztető jelek? („red flags”)

szisztémás tünetek, éjszakai ill. csontfájdalom, az anamnesis, a panaszok és a fizikális vizsgálati eltérések inkongruenciája



Tájékoztató vizsgálat:

duzzadt térd (bal > jobb ?)

Reumatológiai vizsgálat:

- duzzanat (patella ballotálható?)
- érzékenység/fájdalom?
- ízületi mozgástartomány?
- végtaghossz különbség?
- izomzat hypotrophia?



Vizsgálatok

Laboratóriumi

☐Vérkép

☐CRP ☐

☐We

☐ANA

ANA? Diagnózis? Diff dg? Prognózis?

Infektológiai vizsgálatok

☐Lyme-szerológia ☐

☐HIV

☐Strep teszt

☐varicella (VZV IgG)

Képalkotó

☐UH

☐CT

☐Rtg

☐MRI



35





Mi a legvalószínűbb diagnózis?

Oligoarticularis JIA, ANA pozitív

Kezelési terv

- NSAID
- Általános anaesthesiában intraarticularis szteroid kezelés
- Szemészeti konzílium (réslámpás vizsgálat uveitis szűrésére)
- Gyógytorna
- Rendszeres szemészeti szűrés
- Kontroll 3 és 6 hónap múlva...



Megbeszélés

- laboratóriumi vizsgálatok megerősíthetik a diagnózist, de JIA-ban NINCS diagnosztikus teszt (az autoantitestek sem azok)
- laboratóriumi vizsgálatok segítségével zárhatjuk ki az egyéb okokat, pl. izomdystrophia
- laborvizsgálatok eredményei normálisak lehetnek bármilyen betegség fennállása esetén is
- magas CK érték további vizsgálatot igényel ($CK > 500$ IU/L nem a túlzott fizikai aktivitás vagy kisebb trauma következménye)
- rheumatoid factor általában negatív JIA betegekben
- We, CRP: hasznos a betegség aktivitásának követésében
- ANA: prognosztikai faktor
- VZV IgG: immunszuppresszív kezelés előtt oltás, ha szükséges és lehetséges
- vérkép, máj- és vesefunkció: alkalmazott gyógyszerek mellékhatásainak követése